

WYKAZ PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH STOSOWANYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY
W przypadkach wątpliwych proszę kontaktować się z Zespołem ds. Epidemiologii (tel. wew. 160) lub kierownikiem Działu Centralnej Sterylizacji (tel wew. 681).

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

B - bakterie, **F** - grzyby, **V**- wirusy, **Tbc** - prątki gruźlicy, **S** - spory

PREPARAT	STĘŻENIE	CZAS DEZYNFEKCJI	ZAKRES DZIAŁANIA
SANI CLOTH UNIWERSAL- chusteczki bezalkoholowe - do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, skuteczne w warunkach brudnych.	Przydatne do użycia przez 2 miesiące po otwarciu opakowania	1 minuta	B,V (HBV, HCV, HIV, AH5N1, SARS, Corona Virus),Tbc
		15 minut	B, F, V, Tbc
SANI -CLOTH CHLOR +1000 WIPES Chusteczki o działaniu sporobójczym, na bazie stabilnego chloru, skuteczne w warunkach brudnych. Do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego.	Przydatne do użycia przez 30 dni po otwarciu opakowania	1 minuta	B,V,
		5 minut	B, F, V, Tbc, S (Clostridium difficile)
Chusteczki + INCIDIN PRO chusteczki można stosować do przecierania powierzchni wykonanych z: metali, linoleum, PCV, ceramiki, gumy, tworzywa sztucznego - przez przetarcie; nie wymaga spłukiwania, chusteczki ważne 28 dni od chwili zalania pojemnika preparatem Incidin PRO. Po zużyciu chusteczek pojemnik zdezynfekować, umyć, wysuszyć i odesłać do CS do ponownego wypełnienia	0,5 %	15 min	B, F, V

INCIDIN PRO preparat myjąco –dezynfekujący do powierzchni, sprzętu medycznego oraz przedmiotów, które można zanurzyć w roztworze.	0,5%		15 minut	B, F, V
	1,5%		5 minut	B, F, V
	3%		30 minut	B, F, V, Tbc
MIKROZID AF liquid aerozol do powierzchni małych, trudno dostępnych, na bazie alkoholu	Stężony w aerozolu		15 min	B, F, V, Tbc
			30 min	V (Polio)
PERFORM Do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego (aktywność roztworu roboczego 30 godzin), może być stosowany do materiałów o wysokich wymagach (inkubatory, powierzchnie ze szkła akrylowego, masek do oddychania i inhalacji, mankietów używanych do ćwiczeń (dezynfekcja przez zanurzenie, możliwość stosowania w obecności pacjentów).	2,0 %		10 minut	B, Tbc, F, V
SAVO-PRIM do dezynfekcji powierzchni - roztwór roboczy ważny 7 dni	3,0 %		15 min	B, F, V, Tbc
CHLORAMIX DT w tabletkach, roztwór roboczy ważny 24 godziny	Dezynfekcja powierzchni i przedmiotów czystych	1 tabl / 1,5 l wody (1 000 ppm) 2 tabl / 1,5 l wody (2 000 ppm)	30 minut 15 min	B, F, V, Tbc
	Dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną	6 tabl / 1,5 l wody (6 000 ppm)	15 min	B, F, V, Tbc
	Przetarcie miejsc skażonych substancją organiczną	10 tabl / 1,5 l wody (10 000 ppm)	15 min	B, F, V, Tbc, S <i>(Clostridium difficile)</i>
DESAM SOLID Preparat dezynfekcyjny w saszetkach, proszek rozpuszczamy w wodzie zgodnie z instrukcją, po rozpuszczeniu czysty, nieużywany roztwór zużyć do 24 godzin od chwili rozpuszczenia. Dezynfekcja bieżąca przez przetarcie powierzchni delikatnych, zanieczyszczonych kałem z <i>Clostridium difficile</i> firma zewnętrzna	0,15% / 1 saszetka na 5 litrów wody		15 min	B, F, V, Tbc, S <i>(Clostridium difficile)</i>

MEDI SPRAY Alkoholowy nowoczesny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu medycznego. Dedykowany jest do blatów, klamek, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. <i>firma zewnętrzna</i>	Stężony		1 minuta	B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro)
	Stężony		30 sekund	B, F, Wirus Noro
QUATRODES ONE Do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni zmywalnych, łóżka, podłogi, blaty, ściany. <i>firma zewnętrzna</i>	0,5%		15 minut	B, F, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Ebola)
JASOL SOLID Dezynfekcja powierzchni medycznych <i>firma zewnętrzna</i>	Powierzchnie czyste	0,18% - 1 tabletka/1,5 litr wody (1000 ppm)	15 minut	B, F, V
	Powierzchnie czyste	0,36% - 2 tabletka/700ml wody (2 145 ppm)	15 minut	B, F, V, Tbc
	Powierzchnie zanieczyszczone organicznie	1,08% - 1 tabletka/250 ml wody	15 minut	B, F, V, Tbc (Z)
	Powierzchnie zanieczyszczone organicznie, krew, wydzieliny, wydaliny	1,80% -1 tabletka na 150 ml wody (10 000 ppm)	15 minut	B, F, V, Tbc (Z)
	Powierzchnie zanieczyszczone organicznie	1,80% - 9 tabletek na 1litr wody (10 000 ppm)	15 minut	Clostridium difficile

^Z - powierzchnie i przedmioty zanieczyszczone substancjami organicznymi

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

B - bakterie, F - grzyby, V- wirusy, Tbc - prątki gruźlicy, S - spory

PREPARAT	PRZEZNACZENIE	STĘŻENIE	CZAS DEZYNFEKCJI	ZAKRES DZIAŁANIA
CHIROSAN PLUS preparat dezynfekcyjny, aktywny roztwór roboczy jest skuteczny do 12 godzin	Dezynfekcja i czyszczenie narzędzi, endoskopów, narzędzi termolabilnych i inkubatorów ,powierzchni zmywalnych	2%	10 minut	B, F, V, Tbc, S
STABIMED FRESH preparat myjąco-dezynfekujący	Mycie i dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, termostabilnych i termolabilnych wyrobów i urządzeń medycznych, endoskopów giętkich, może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych;	2%	15 minut	B, F, V, Tbc
NEODISHER SEPTO PRECLEAN preparat myjąco-dezynfekujący. Roztwór roboczy jest skuteczny do 7 dni	Mycie i dezynfekcja termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, endoskopów elastycznych, myjki ultradźwiękowe.	1,5%	15 minut	B, F, V, Tbc
GIGAZYME XTRA Roztwór roboczy skuteczny 24 godziny.	Enzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, endoskopów, przyrządów anestetycznych.	1% 2%	30 minut 15 minut	B, F, V

ODKAŻANIE RAN, ŚLUZÓWEK I SKÓRY PACJENTÓW

B - bakterie, **F** - grzyby, **V**- wirusy, **Tbc** - prątki gruźlicy, **S** – spory

PREPARAT	ZASTOSOWANIE	PRZECIW - WSKAZANIA	STĘŻENIE	CZAS DZIAŁANIA	ZAKRES
SKINSEPT PUR	<i>Odkazanie skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniami, zmianą opatrunku.</i>	Nie stosować z rozprysku dla małych dzieci.	Stężony, lek na- nieść przy pomo- cy tamponu na skórę.	15 sekund 2 minut przy zagrożeniu wirusem HBV	B, F, V (oprócz HBV), Tbc B, F, V, Tbc
AHD 1000	<i>Dezynfekcja skóry</i> <i>Dezynfekcja skóry przed zabiegami z naruszeniem ciągłości skóry</i>	brak danych	stężony	15 sekund 1 minuta	B, F, V (AH1N1, Noro) B, F, V, Tbc
OCTENISEPT	<i>Opracowanie czystych i płukanie zakażonych ran chirurgicznych, ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych.</i> <i>Pielęgnacja ran i szwów pooperacyjnych.</i> <i>Przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym, przy cewnikowaniu.</i> <i>Przy czynnościach przed, po i w trakcie porodu, w obrębie narządów rodnych kobiet</i>	Uczulenie na składniki, unikać kontaktu preparatu z oczami i uchem wewnętrznym, nie połykać. Nie stosować preparatu w ciąży i okresie karmienia. Nie stosować równolegle z preparatami na bazie jodu.	stężony	1 minuta działanie od aplikacji utrzymuje przez 60 minut. 20 sekund - płukanie jamy ustnej	B, F, V

	<p><i>i mężczyzn, pooperacyjne i poporodowe irygacje pochwy, przed założeniem wkładki wewnątrzmacicznej.</i></p> <p><i>Przy czynnościach związanych ze sztucznym zapłodnieniem, w pediatrii.</i></p> <p><i>Do dezynfekcji jamy ustnej: afty, resekcja zęba.</i></p>				
<p>KODAN BARWIONY (akoholowy, barwiony płyn do dezynfekcji skóry)</p>	<p><i>Dezynfekcja skóry przed zastrzykami i punkcjami.</i></p> <p><i>Dezynfekcja przed operacjami.</i></p> <p><i>Opatrywanie ran i zdejmowanie szwów.</i></p>	<p>Uczulenie na składniki.</p>	<p>steżony</p>	<p>15 sekund przed zastrzykami i pobieraniem krwi, 60 sekund przed punkcjami, operacjami</p>	<p>B, F, V, Tbc</p>
<p>BRAUNOL 2000 (roztwór wodny powidonu jodu)</p>	<p><i>Dezynfekcja skóry i śluzówek (jama ustno-gardłowa, zewnętrzne narządy moczowo-płciowe, pochwa, spojówki), antyseptyka oparzeń, owrzodzeń, zranień, w zakażonych zmianach skórnych, przed iniekcjami, przy kaniulacji żył i tętnic, przed punkcjami, zabiegami chirurgicznymi (przed, w trakcie i po operacji, przy zaopatrywaniu ran), dezynfekcja i płukanie pochwy, sromu, drenaż cewnika, przedoperacyjna aseptyka oka, płukanie oka po przypadkowym zanieczyszczeniu.</i></p>	<p>Nadwrażliwość na jod, nadczynność tarczycy i inne choroby tarczycy, syndrom opryszczkowego zapalenia skóry, przed i po terapii aktywnym jodem, dzieci do 6 miesiąca życia.</p>	<p>steżony</p>	<p>15 sekund - przed iniekcjami i punkcjami</p> <p>1 minuta - przed punkcjami stawów lub jam ciała, przed zabiegami</p>	<p>B (MRSA), F, V, Tbc</p>
<p>MICRODACYN</p>	<p><i>Odkażanie i płukanie ran ostrych oraz przewlekłych.</i></p>	<p>Nie podano</p>	<p>steżony</p>	<p>15 minut</p>	<p>B, F, V</p>
<p>SPIRYTUS 70% CZYSTY</p>	<p><i>Odkażanie skóry</i></p>	<p>Nie podano</p>	<p>steżony</p>	<p>1 minuta</p>	<p>B, F, Tbc</p>

MED HYGIENIC	<i>Oczyszczanie i dezynfekcja i skóry przy: pobraniach krwi, szczepieniach.</i>	Nie stosować do oczu, na śluzówki, pod opatrunki.	Gaziki nasączone: 70% izopropanol, 0,5% glukonian chlorheksydyny	15 sekund	B, F, Tbc
MEDI PAD	<i>Oczyszczanie i dezynfekcja skóry przy: iniekcjach, pobraniach krwi, szczepieniach, skaleczeniach, otarciach.</i>	Nie stosować do oczu, na śluzówki, pod opatrunki.	Gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym	Do wyschnięcia	B, F, Tbc
SOFT HYGIENIC SKIN	<i>Oczyszczanie i dezynfekcja skóry przy: pobraniach krwi, szczepieniach.</i>	Nie stosować do oczu, na śluzówki, pod opatrunki.	Chusteczki nasączone alkoholem izopropylowym i diglukonianem chlorheksydyny	30 sekund	B, F, Tbc
CHLORHEKSYDYNY DIGLUKONIAN 20% ROZTWÓR substancja o silnym działaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym	<i>Dezynfekcja skóry przed założeniem centralnego cewnika naczyniowego, w czasie wymiany opatrunków.</i>	Nadwrażliwość na chlorheksydynę.	0,5-1 % roztwór alkoholowy	Wcierać przez 30 sekund	B,V (opryszczka, grypa, cytomegalia, HIV), F (słabo)
	<i>Dezynfekcja cewki moczowej przed założeniem cewnika Foleya ,przemywanie ran, wymiana opatrunków przy cewnikach centralnych, gdy producent cewników nie zezwala na stosowanie środków alkoholowych w kontakcie z cewnikiem.</i>	Nie stosować: - u niemowląt i małych dzieci; - przy zabiegach w obrębie centralnego układu nerwowego i kanału słuchowego; - w okulistyce	0,25-0,5 % roztwór wodny	Do wyschnięcia preparatu	
	<i>Dezynfekcja pochwy i krocza w położnictwie i ginekologii.</i>		0,02 % - 0,05% roztwór wodny		

DEZYNFEKCJA RĄK

B - bakterie, **F** - grzyby, **V**- wirusy, **Tbc** - prątki gruźlicy, **S** – spory

PREPARAT	ZASTOSOWANIE	CZAS	ZAKRES DZIAŁANIA
ANIOSGEL 85 NPC STERISOL 70% alkohol, stężony	Higieniczna dezynfekcja rąk	Wcierać 3 ml preparatu przez 30 sekund.	B, F, V, Tbc,
	Chirurgiczna dezynfekcja rąk	Wcierać 3 ml preparatu przez 45 sekund, czynność powtórzyć.	
DESDERMAN PURE stężony	Higieniczna dezynfekcja rąk	Wcierać 3 ml preparatu przez 30 sekund	B, F, V, Tbc,
	Chirurgiczna dezynfekcja rąk	Wcierać 5 ml preparatu przez 90 sekund, czynność powtórzyć.	

